

# CROTALARIA

## Crotalaria Juncea

**Familia:** Fabáceas o leguminosas.



**Preparación de la tierra:** El preparo del suelo debe ser realizado de modo a propiciar un buen establecimiento de los cultivos siendo utilizado equipos apropiados en el período correcto, considerando que el preparo del suelo es de los aspectos más importantes para la nacencia. Se debe de conseguir una tierra suelta lo que nos permitirá tener la profundidad de siembra adecuada.



**Siembra y establecimiento:** Dato a tener en cuenta es la superficie de siembra, la superficie correcta es de 1 cm. de profundidad en suelo.

- La utilización de rulo compactador mejora la calidad de la siembra en función de la aceleración uniforme de la germinación de las semillas.

El establecimiento se debe de producir cuando la luminosidad y temperatura son las adecuadas para germinación. Suele coincidir con temperaturas mínimas por encima de 10 grados centígrados.





**Riego:** El agua es necesaria para que se produzca la germinación. Cuando las semillas se hidratan con la humedad del suelo, absorben agua. Es el proceso inicial de la germinación.

### **Riego por aspersión:**

- Riego de germinación, de la cantidad necesaria para hacer homogénea la humedad en el suelo, teniendo en cuenta los factores climáticos (viento, el tipo y textura del suelo, orografía del terreno). Aportar la suficiente agua para juntar la humedad en el suelo utilizando un volumen elevado de agua para no tener problema de “cocción” de la semilla por las altas temperaturas existentes en la fecha de implantación, evitando siempre el encharcamiento.
- Riegos posteriores: teniendo en cuenta los factores climáticos (viento, el tipo y textura del suelo, orografía del terreno) deberos de aportar riegos semanales entorno a 20 litros metro cuadrado. Aplicando un máximo de 150 a 170 litros metro cuadrado en el ciclo completo del cultivo 6 a 8 semanas.

### **Riegos a pie o inundación:**

- Primer riego germinación, con este tipo de riegos coge aun más importancia el uso del rulo compactador para evitar el posible arrastre de la semilla.
- Segundo riego mitad de ciclo: se le debe aportar cuando el cultivo se encuentre en mitad de ciclo, teniendo en cuenta que tiene un ciclo medio de 7 semanas, nos referimos al día 25 desde la siembra. No se aconseja mayores números de riegos dado que su sistema radicular en muy pivotante Crotalaria la absorción de agua la obtiene en el subsuelo.



#### Manejo uso abono verde o forrajero:

- **Abono verde:** incorporar al suelo en el inicio de la floración para aprovechar su potencial en la fijación de nitrógeno en el suelo, y evitar la aparición de semillas para su correcta incorporación. La materia orgánica aportada es de fácil mineralización. **Se aconseja el uso junto a la semilla de inoculante para potenciar su acción de fijación de nitrógeno.**

Por ejemplo, para cultivar hortalizas después de Crotalaria el cultivo posterior debe incorporarse en el suelo durante el periodo de los 60 días posteriores a la incorporación de Crotalaria al suelo. Esta práctica garantiza la suficiente descomposición de Crotalaria.

- **Forrajero:** Segar en el momento de la floración, el porcentaje de floración de la planta estará directamente vinculado al porcentaje de proteína del heno. Con un porcentaje de floración bajo sus porcentajes de proteínas serán altos. El heno debe hacerse con la humedad necesaria para mantener la mayor calidad, la calidad va sujeta a la protección y salvaguardo de la hoja.



**Control de malezas:** Crotalaria juncea es de las familias de las fabáceas lo que implica que está catalogada como cultivo de hoja ancha.

---

- Control de malezas hoja estrecha: el control de malezas de hoja estrecha se puede realizar en presembrado o posterior a la siembra utilizando cualquier herbicida selectivo que encontremos en el mercado.
- Control de malezas hoja ancha: tratándose Crotalaria juncea de un cultivo de hoja ancha debemos de tener muchas precauciones a la hora de elegir el herbicida para combatir hoja ancha. Exclusivamente como herbicida testado podemos recomendar en preemergencia Stom Aqua (Pendimetalina 45,5%) a una dosis de 1,5 litros hectárea. La correcta aplicación debe de realizarse con la semilla establecida en el suelo y posteriormente a su aplicación realizar un ligero riego para su perfecta acción.



**Abonado:** Cabe destacar que Crotalaria juncea es de las familias de las leguminosas por lo que lleva intrínseco su capacidad de fijación de nitrógeno en suelo, acción que realiza al captar CO<sub>2</sub> de la atmósfera y transformarlo en nitrógeno mediante la fijación de este por su raíces. La fijación de nitrógeno como la aportación de materia orgánica y la reducción de la población de nematodos en el suelo son sus características principales que hacen que Crotalaria juncea sea un abono verde de referencia a nivel internacional.

En su uso forrajero, donde el fin es sacar el mayor rendimiento posible para obtener las más altas producciones el abonado como en todos los cultivos es una base a tener en cuenta.

Abonos aconsejables: los niveles de fósforo, nitrógeno y potasa debemos de mantenerlos en su estado óptimo dado que son macro elementos que están vinculados al crecimiento de las especies vegetales. Se aconseja abonados no muy ricos en nitrógeno y altos en fósforo y potasa.



**Enfermedades:** Crotalaria juncea puede ser sensible a la plaga de insectos como la gardama, rosquilla o insectos polífagos, si estos estuviesen presentes en el cultivo de Crotalaria debemos de tratar con un insecticida que contenga piretrina, insecticida sistemático que puede encontrarse habitualmente en tiendas.