



Arachis Pintoï

Arachis pintoï

LEGUMINOSA · PERENNE · TROPICAL / SIN HELADAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Leguminosa perenne tropical de porte rastrero para cobertura viva, frutales, sombra y pasturas, con fijación de nitrógeno y protección duradera del suelo.

POR QUÉ CONSIDERAR ESTE PRODUCTO

- **Cobertura viva**
Puede proteger el piso de frutales cuando se manejan competencia, corte y humedad.
- **Desempeño en pastura**
Apoya sistemas productivos cuando entrada, residual, descanso y fertilidad se manejan como un solo programa.
- **Adaptación a sombra**
Mantiene cobertura útil bajo sombra parcial cuando el establecimiento es adecuado.
- **Nitrógeno biológico**
Como leguminosa, puede apoyar la fijación biológica de nitrógeno con rizobios compatibles y buen establecimiento.

RESUMEN DEL PRODUCTO

TIPO DE CULTIVO

Leguminosa · Perenne

ESTACIÓN / CLIMA

Tropical / sin heladas

FUNCIONES PRINCIPALES

Orchards · Pastura · Shade

APTITUD GENERAL DEL SUELO

Confirmar localmente

pH DEL SUELO

4.5–7.0 · referencia de la especie

Establezca bien. Maneje el ciclo completo

ESTABLECIMIENTO

- 01 Elija la ventana**
Ajuste la siembra a la estación del producto, el riesgo de heladas y la perspectiva de humedad del lote.
- 02 Analice y prepare**
Use un análisis de suelo vigente, controle la vegetación competidora y prepare la zona para lograr buen contacto.
- 03 Calibre el lote**
Confirme el lote de semilla, germinación, tratamiento y si la dosis se expresa como semilla a granel o semilla pura viable.
- 04 Establezca con cuidado**
Siga la referencia técnica para colocación y método, y verifique temprano emergencia y uniformidad.
- 05 Favorezca la nodulación**
Use el inoculante compatible cuando corresponda y protéjalo del calor, secado y tratamientos incompatibles.

REFERENCIA TÉCNICA

pH del suelo
4.5–7.0 · referencia de la especie

Profundidad de siembra
2–6 cm

Materia seca
8–12 t/ha/año

Proteína cruda
17–20%

Digestibilidad
67–71%

Precipitación
>1,100 mm preferidos

MANEJO

- 01 Defina el objetivo**
Maneje el cultivo para su función principal: cobertura, recuperación del suelo, forraje, grano, tubérculos o una combinación planificada.
- 02 Observe la etapa**
Use la etapa del cultivo y la condición del lote, no solo el calendario, para decidir pastoreo, cosecha o terminación.
- 03 Mantenga la función**
Monitoree humedad, fertilidad, malezas, plagas y densidad; ajuste antes de perder productividad.
- 04 Planifique lo siguiente**
Coordine residuo, rebrote o terminación con las necesidades y la ventana de la siguiente actividad.
- 05 Verifique localmente**
Adapte el programa al clima, suelo, regulación, categoría animal y etiqueta del producto en su mercado.

Tolerancia a sequía
Moderada una vez establecida

Nitrógeno
Hasta 300 kg/ha/año

Dosis de semilla con vaina
10–15 kg/ha

Cobertura completa
≈6 meses

Hábito de crecimiento
Rastrera y estolonífera

Tolerancia a inundación
Moderada

NOTA IMPORTANTE DE MANEJO

Los valores de referencia no son garantías de desempeño. Confirme el lote, la etiqueta, la recomendación agronómica local y cualquier restricción de uso animal antes de sembrar o alimentar.

Base técnica: Tropical Seeds — Arachis pintoi technical brochure

NOTA DE CAMPO

Las dosis y el desempeño varían según ambiente, lote y manejo. Escanee para consultar el perfil vigente y los recursos de apoyo.

MÁS INFORMACIÓN

