

Camello Blend

Brachiaria hybrid blend GP3025 + GP3207

GRAMÍNEA · PERENNE · ESTACIÓN CÁLIDA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mezcla perenne de híbridos de Brachiaria diseñada para pasturas resilientes, tolerancia a sequía, estabilidad productiva y manejo de salivazo.

POR QUÉ CONSIDERAR ESTE PRODUCTO

- **Desempeño en pastura**
Apoya sistemas productivos cuando entrada, residual, descanso y fertilidad se manejan como un solo programa.
- **Resiliencia a periodos secos**
Una vez establecido, puede mantener función útil en periodos secos según la profundidad del suelo y las condiciones locales.
- **Resiliencia a plagas**
Los componentes seleccionados apoyan resiliencia donde el salivazo representa un riesgo importante.
- **Flexibilidad de cosecha**
Puede programarse para heno o forraje conservado cuando la madurez y el secado son adecuados.

RESUMEN DEL PRODUCTO

TIPO DE CULTIVO

Gramínea · Perenne

ESTACIÓN / CLIMA

Estación cálida

FUNCIONES PRINCIPALES

Pastura · Sequía · Spittlebug

APTITUD GENERAL DEL SUELO

Confirmar localmente

pH DEL SUELO

4.5–8.0

Establezca bien. Maneje el ciclo completo

ESTABLECIMIENTO

- 01 Elija la ventana**
Ajuste la siembra a la estación del producto, el riesgo de heladas y la perspectiva de humedad del lote.
- 02 Analice y prepare**
Use un análisis de suelo vigente, controle la vegetación competidora y prepare la zona para lograr buen contacto.
- 03 Calibre el lote**
Confirme el lote de semilla, germinación, tratamiento y si la dosis se expresa como semilla a granel o semilla pura viable.
- 04 Establezca con cuidado**
Siga la referencia técnica para colocación y método, y verifique temprano emergencia y uniformidad.
- 05 Proteja el establecimiento**
Retrase tránsito, pastoreo o cosecha hasta que raíces y puntos de crecimiento permitan recuperación.

REFERENCIA TÉCNICA

pH del suelo
4.5–8.0

Dosis de siembra
8–10 kg/ha

Primer pastoreo
80–90 días

Materia seca
27–30 t/ha/año

Proteína cruda
Hasta 16%

Digestibilidad
Hasta 65%

MANEJO

- 01 Defina el objetivo**
Maneje el cultivo para su función principal: cobertura, recuperación del suelo, forraje, grano, tubérculos o una combinación planificada.
- 02 Observe la etapa**
Use la etapa del cultivo y la condición del lote, no solo el calendario, para decidir pastoreo, cosecha o terminación.
- 03 Mantenga la función**
Monitoree humedad, fertilidad, malezas, plagas y densidad; ajuste antes de perder productividad.
- 04 Planifique lo siguiente**
Coordine residuo, rebrote o terminación con las necesidades y la ventana de la siguiente actividad.
- 05 Verifique localmente**
Adapte el programa al clima, suelo, regulación, categoría animal y etiqueta del producto en su mercado.

Altura
80–110 cm

Residual
15–20 cm

Tolerancia a anegamiento
Baja

Periodo de descanso
25–35 días

Hábito de crecimiento
Perenne semidecumbente

Altitud
0–1,400 m

NOTA IMPORTANTE DE MANEJO

Los valores de referencia no son garantías de desempeño. Confirme el lote, la etiqueta, la recomendación agronómica local y cualquier restricción de uso animal antes de sembrar o alimentar.

Base técnica: Tropical Seeds — Grasses Fichas Técnicas; Grupo Papalotla — current Camello product page

NOTA DE CAMPO

Las dosis y el desempeño varían según ambiente, lote y manejo. Escanee para consultar el perfil vigente y los recursos de apoyo.

MÁS INFORMACIÓN



EVIDENCIA DE CAMPO ESPECÍFICA DEL SITIO

Desempeño de Camello en suelo arenoso

Farm Bovilândia · Mato Grosso, Brazil

Siembra 12 dic 2024 · Cosecha 1 mar 2025

Observación de campo suministrada en suelo arenoso, con 1.500 mm de lluvia entre octubre y abril, 1,5 t/ha de cal y el programa de fertilización con fósforo y azufre reportado.

RENDIMIENTO DE MS

5,353 lb/ac

Una cosecha

PROTEÍNA CRUDA

14%

DIGESTIBILIDAD

67%

FDN

62%

NDT

61%

OFERTA ESTIMADA

4.5 AU / 30 days

CMS al 2,5% del PV

QUÉ MUESTRA EL RESULTADO SUMINISTRADO

- La observación documenta producción de materia seca y calidad forrajera en un ambiente sembrado sobre suelo arenoso.
- El dossier cita 500 mm de lluvia anual como referencia de posicionamiento; no debe tratarse como un umbral garantizado.


INTERPRETAR CON CONTEXTO

Resultado observado en campo, no una garantía de desempeño. Confirmar identidad del producto, forma actual de semilla y recomendación agronómica local.


IMÁGENES DE CAMPO SUMINISTRADAS

Registro visual de la evaluación


Imágenes extraídas del dossier de resultados técnicos de Papalotla y conservadas junto con la evidencia del producto nombrado.



Lote de Camello con ganado en el sitio de Brasil




Vista aérea del pastoreo




Inspección de campo durante la evaluación



Equipo de socios y agronomía



Inspección de biomasa en pie



Muestra de forraje medida




Imagen de pastura suministrada con el dossier