

Hairy Vetch Orium

Vicia villosa

LEGUMINOSA · ANUAL · ESTACIÓN FRESCA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Veza vellosa anual producida en España, de tolerancia media al frío, para cobertura de estación fresca, fijación de nitrógeno y forraje manejado.

POR QUÉ CONSIDERAR ESTE PRODUCTO

- **Aptitud para estación fresca**
Extiende la cobertura viva y la función del cultivo durante la parte fresca del calendario productivo.
- **Nitrógeno biológico**
Como leguminosa, puede apoyar la fijación biológica de nitrógeno con rizobios compatibles y buen establecimiento.
- **Forraje manejado**
Puede apoyar objetivos forrajeros al coordinar etapa de cosecha, categoría animal y orientación local.
- **Tolerancia media al frío**
Ofrece desempeño útil en estación fresca donde el invierno se mantiene dentro de la tolerancia del producto.

RESUMEN DEL PRODUCTO

TIPO DE CULTIVO

Leguminosa · Anual

ESTACIÓN / CLIMA

Estación fresca

FUNCIONES PRINCIPALES

Estación fresca · Nitrogen · Forraje

APTITUD GENERAL DEL SUELO

Confirmar localmente

pH DEL SUELO

5.5–7.0 · referencia de la especie

Establezca bien. Maneje el ciclo completo

ESTABLECIMIENTO

- 01 Elija la ventana**
Ajuste la siembra a la estación del producto, el riesgo de heladas y la perspectiva de humedad del lote.
- 02 Analice y prepare**
Use un análisis de suelo vigente, controle la vegetación competidora y prepare la zona para lograr buen contacto.
- 03 Calibre el lote**
Confirme el lote de semilla, germinación, tratamiento y si la dosis se expresa como semilla a granel o semilla pura viable.
- 04 Establezca con cuidado**
Siga la referencia técnica para colocación y método, y verifique temprano emergencia y uniformidad.
- 05 Favorezca la nodulación**
Use el inoculante compatible cuando corresponda y protéjalo del calor, secado y tratamientos incompatibles.

MANEJO

- 01 Defina el objetivo**
Maneje el cultivo para su función principal: cobertura, recuperación del suelo, forraje, grano, tubérculos o una combinación planificada.
- 02 Observe la etapa**
Use la etapa del cultivo y la condición del lote, no solo el calendario, para decidir pastoreo, cosecha o terminación.
- 03 Mantenga la función**
Monitoree humedad, fertilidad, malezas, plagas y densidad; ajuste antes de perder productividad.
- 04 Planifique lo siguiente**
Coordine residuo, rebrote o terminación con las necesidades y la ventana de la siguiente actividad.
- 05 Verifique localmente**
Adapte el programa al clima, suelo, regulación, categoría animal y etiqueta del producto en su mercado.

REFERENCIA TÉCNICA

pH del suelo
5.5–7.0 · referencia de la especie

Dosis de siembra
50–80 kg/ha

Profundidad de siembra
1–2 cm

Materia seca
7–8 t/ha

Precipitación
325–600 mm

Tolerancia al frío
Media

Tolerancia a sequía
Muy alta

Tolerancia a anegamiento
Baja

Origen de producción
Spain

Usos
Forraje, abono verde, cobertura

Hábito de crecimiento
Trepadora o semierecta, hasta 1 m

Tolerancia a salinidad
Media

NOTA IMPORTANTE DE MANEJO

Los valores de referencia no son garantías de desempeño. Confirme el lote, la etiqueta, la recomendación agronómica local y cualquier restricción de uso animal antes de sembrar o alimentar.

Base técnica: ESSeeds — Hairy Vetch Orium official product profile; Tropical Seeds — Hairy Vetch files and product-origin guidance

NOTA DE CAMPO

Las dosis y el desempeño varían según ambiente, lote y manejo. Escanee para consultar el perfil vigente y los recursos de apoyo.

MÁS INFORMACIÓN

