

Mestizo Blend

Brachiaria hybrid blend CIAT 36087 + GP3025 + GP3207

GRAMÍNEA · PERENNE · ESTACIÓN CÁLIDA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mezcla perenne de híbridos de Brachiaria que combina calidad forrajera, tolerancia a sequía y diversidad genética para pasturas tropicales.

POR QUÉ CONSIDERAR ESTE PRODUCTO

- **Desempeño en pastura**
Apoya sistemas productivos cuando entrada, residual, descanso y fertilidad se manejan como un solo programa.
- **Resiliencia a periodos secos**
Una vez establecido, puede mantener función útil en periodos secos según la profundidad del suelo y las condiciones locales.
- **Calidad forrajera**
Combina crecimiento productivo con calidad dependiente de la etapa de cosecha y del buen manejo.
- **Mezcla complementaria**
Combina fortalezas genéticas distintas para ampliar adaptación y resiliencia de manejo.

RESUMEN DEL PRODUCTO

TIPO DE CULTIVO

Gramínea · Perenne

ESTACIÓN / CLIMA

Estación cálida

FUNCIONES PRINCIPALES

Pastura · Sequía · Forraje quality

APTITUD GENERAL DEL SUELO

Confirmar localmente

pH DEL SUELO

4.5–8.0

Establezca bien. Maneje el ciclo completo

ESTABLECIMIENTO

- 01 Elija la ventana**
Ajuste la siembra a la estación del producto, el riesgo de heladas y la perspectiva de humedad del lote.
- 02 Analice y prepare**
Use un análisis de suelo vigente, controle la vegetación competidora y prepare la zona para lograr buen contacto.
- 03 Calibre el lote**
Confirme el lote de semilla, germinación, tratamiento y si la dosis se expresa como semilla a granel o semilla pura viable.
- 04 Establezca con cuidado**
Siga la referencia técnica para colocación y método, y verifique temprano emergencia y uniformidad.
- 05 Proteja el establecimiento**
Retrase tránsito, pastoreo o cosecha hasta que raíces y puntos de crecimiento permitan recuperación.

REFERENCIA TÉCNICA

pH del suelo
4.5–8.0

Dosis de siembra
8–10 kg/ha

Primer pastoreo
80–90 días

Materia seca
25–30 t/ha/año

Proteína cruda
Hasta 19%

Digestibilidad
Hasta 68%

MANEJO

- 01 Defina el objetivo**
Maneje el cultivo para su función principal: cobertura, recuperación del suelo, forraje, grano, tubérculos o una combinación planificada.
- 02 Observe la etapa**
Use la etapa del cultivo y la condición del lote, no solo el calendario, para decidir pastoreo, cosecha o terminación.
- 03 Mantenga la función**
Monitoree humedad, fertilidad, malezas, plagas y densidad; ajuste antes de perder productividad.
- 04 Planifique lo siguiente**
Coordine residuo, rebrote o terminación con las necesidades y la ventana de la siguiente actividad.
- 05 Verifique localmente**
Adapte el programa al clima, suelo, regulación, categoría animal y etiqueta del producto en su mercado.

Altura
120–150 cm

Residual
15–20 cm

Tolerancia a anegamiento
Baja

Periodo de descanso
25–35 días

Hábito de crecimiento
Perenne semidecumbente

Altitud
0–1,400 m

NOTA IMPORTANTE DE MANEJO

Los valores de referencia no son garantías de desempeño. Confirme el lote, la etiqueta, la recomendación agronómica local y cualquier restricción de uso animal antes de sembrar o alimentar.

Base técnica: Tropical Seeds — Grasses Fichas Técnicas; Grupo Papalotla — current Mestizo product page

NOTA DE CAMPO

Las dosis y el desempeño varían según ambiente, lote y manejo. Escanee para consultar el perfil vigente y los recursos de apoyo.

MÁS INFORMACIÓN



EVIDENCIA DE CAMPO ESPECÍFICA DEL SITIO

Perfil radicular de Mestizo frente a Ruziziensis

Fazenda Uberaba · Mato Grosso do Sul, Brazil

Siembra 21 mar 2025 · Evaluación a los 5 meses y 12 días

Comparación suministrada en trinchera de suelo, con 5 kg/ha, midiendo el perfil de 0-100 cm en cuatro horizontes de 25 cm.

BIOMASA RADICULAR ACUMULADA

5,710

Ruziziensis 1.963 · +191%

EVALUACIÓN 0-25 CM

15

Ruziziensis 5

EVALUACIÓN 25-50 CM

5

Ruziziensis 3

EVALUACIÓN 50-75 CM

7

Ruziziensis 1

EVALUACIÓN 75-100 CM

5

Ruziziensis 2

QUÉ MUESTRA EL RESULTADO SUMINISTRADO

- Mestizo superó a Ruziziensis en la medida acumulada de 0-100 cm y en cada horizonte reportado.
- La fuente no indica claramente la unidad de los cuatro valores por horizonte; se reproducen sin añadir una unidad.

INTERPRETAR CON CONTEXTO

Resultado observado en campo, no una garantía de desempeño. Confirmar identidad del producto, forma actual de semilla y recomendación agronómica local.

EVIDENCIA DE CAMPO ESPECÍFICA DEL SITIO

Masa forrajera y nutrientes en el residuo de Mestizo

Fazenda Uberaba · Mato Grosso do Sul, Brazil

Evaluación 26 jun 2025

Comparación suministrada con Ruziensiis que combina materia seca, análisis de nutrientes en el residuo e imágenes NDVI de OneSoil.

MATERIA SECA

4,405 lb/ac

Ruziensiis 3.047 · +44%

NITRÓGENO EN RESIDUO

114 lb/ac

Ruziensiis 78

FÓSFORO

15 lb/ac

Ruziensiis 8

POTASIO

103 lb/ac

Ruziensiis 86

CALCIO

21 lb/ac

Ruziensiis 21

MAGNESIO

20 lb/ac

Ruziensiis 12

AZUFRE

12 lb/ac

Ruziensiis 7

QUÉ MUESTRA EL RESULTADO SUMINISTRADO

- El análisis reporta más materia seca y mayor N, P, K, Mg y S en el residuo de Mestizo; el calcio fue igual.
- Los nutrientes del residuo describen material disponible para ciclar, no un crédito de fertilizante equivalente.

INTERPRETAR CON CONTEXTO

Resultado observado en campo, no una garantía de desempeño. Confirmar identidad del producto, forma actual de semilla y recomendación agronómica local.

IMÁGENES DE CAMPO SUMINISTRADAS

Registro visual de la evaluación

Imágenes extraídas del dossier de resultados técnicos de Papalotla y conservadas junto con la evidencia del producto nombrado.

