



Cayman Blend

Brachiaria hybrid blend GPO423 + CIAT GP4009BR

GRAMÍNEA · PERENNE · ESTACIÓN CÁLIDA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mezcla perenne de híbridos de Brachiaria para suelos pesados y ambientes con anegamiento temporal, manteniendo utilidad para pastoreo y periodos secos.

POR QUÉ CONSIDERAR ESTE PRODUCTO

- **Aptitud para suelos húmedos**
Ofrece adaptación útil donde el exceso temporal de humedad limita opciones menos tolerantes.
- **Desempeño en pastura**
Apoya sistemas productivos cuando entrada, residual, descanso y fertilidad se manejan como un solo programa.
- **Resiliencia a periodos secos**
Una vez establecido, puede mantener función útil en periodos secos según la profundidad del suelo y las condiciones locales.
- **Ajuste al sistema**
Use el perfil, la información vigente del lote y la orientación agronómica local para ubicar este producto en el sistema correcto.

RESUMEN DEL PRODUCTO

TIPO DE CULTIVO

Gramínea · Perenne

ESTACIÓN / CLIMA

Estación cálida

FUNCIONES PRINCIPALES

Anegamiento · Pastura · Sequía

APTITUD GENERAL DEL SUELO

Confirmar localmente

pH DEL SUELO

4.5–8.0

Establezca bien. Maneje el ciclo completo

ESTABLECIMIENTO

- 01 Elija la ventana**
Ajuste la siembra a la estación del producto, el riesgo de heladas y la perspectiva de humedad del lote.
- 02 Analice y prepare**
Use un análisis de suelo vigente, controle la vegetación competidora y prepare la zona para lograr buen contacto.
- 03 Calibre el lote**
Confirme el lote de semilla, germinación, tratamiento y si la dosis se expresa como semilla a granel o semilla pura viable.
- 04 Establezca con cuidado**
Siga la referencia técnica para colocación y método, y verifique temprano emergencia y uniformidad.
- 05 Proteja el establecimiento**
Retrase tránsito, pastoreo o cosecha hasta que raíces y puntos de crecimiento permitan recuperación.

REFERENCIA TÉCNICA

pH del suelo
4.5–8.0

Dosis de siembra
8–10 kg/ha

Primer pastoreo
90–100 días

Materia seca
25–30 t/ha/año

Proteína cruda
Hasta 18%

Digestibilidad
Hasta 68%

MANEJO

- 01 Defina el objetivo**
Maneje el cultivo para su función principal: cobertura, recuperación del suelo, forraje, grano, tubérculos o una combinación planificada.
- 02 Observe la etapa**
Use la etapa del cultivo y la condición del lote, no solo el calendario, para decidir pastoreo, cosecha o terminación.
- 03 Mantenga la función**
Monitoree humedad, fertilidad, malezas, plagas y densidad; ajuste antes de perder productividad.
- 04 Planifique lo siguiente**
Coordine residuo, rebrote o terminación con las necesidades y la ventana de la siguiente actividad.
- 05 Verifique localmente**
Adapte el programa al clima, suelo, regulación, categoría animal y etiqueta del producto en su mercado.

Altura
100–120 cm

Residual
15–20 cm

Tolerancia a anegamiento
Alta

Periodo de descanso
25–35 días

Hábito de crecimiento
Semidecumbente y estolonífera

Fertilidad del suelo
Media–alta

NOTA IMPORTANTE DE MANEJO

Los valores de referencia no son garantías de desempeño. Confirme el lote, la etiqueta, la recomendación agronómica local y cualquier restricción de uso animal antes de sembrar o alimentar.

Base técnica: Tropical Seeds — Grasses Fichas Técnicas; Grupo Papalotla — current Cayman product page

NOTA DE CAMPO

Las dosis y el desempeño varían según ambiente, lote y manejo. Escanee para consultar el perfil vigente y los recursos de apoyo.

MÁS INFORMACIÓN



EVIDENCIA DE CAMPO ESPECÍFICA DEL SITIO

Calidad de Cayman frente a Myiagi

Fazenda Monte Sião · Goiás, Brazil

Siembra 7 feb 2025 · Muestreo 10 jun 2025

Comparación suministrada bajo 1.460 mm de lluvia anual y un período seco de mayo a octubre. Los resultados corresponden a un sitio y una fecha de muestreo.

RENDIMIENTO DE MV

26,765 lb/ac

Myiagi 29.442

PROTEÍNA CRUDA

12%

Myiagi 8%

DIGESTIBILIDAD

77%

Myiagi 58%

FDN

62%

Myiagi 66%

NDT

62%

Myiagi 53%

RENDIMIENTO DE PC

936 kg CP/ha

Myiagi 830 · +13%

QUÉ MUESTRA EL RESULTADO SUMINISTRADO

- Cayman produjo menos materia verde en este muestreo, pero más proteína, digestibilidad y energía, con menor FDN.

INTERPRETAR CON CONTEXTO

Resultado observado en campo, no una garantía de desempeño. Confirmar identidad del producto, forma actual de semilla y recomendación agronómica local.

IMÁGENES DE CAMPO SUMINISTRADAS

Registro visual de la evaluación

Imágenes extraídas del dossier de resultados técnicos de Papalotla y conservadas junto con la evidencia del producto nombrado.



Forraje picado de la comparación de Cayman



Cosecha de campo durante la evaluación



Muestra comparadora de Myiagi



Muestra de Cayman de la misma comparación