



Cobra

Brachiaria hybrid BR02/1752

GRAMÍNEA · PERENNE · ESTACIÓN CÁLIDA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Híbrido erecto de Brachiaria para corte y acarreo, heno y ensilaje, con producción de forraje en ambientes tropicales y tolerancia a sequía.

POR QUÉ CONSIDERAR ESTE PRODUCTO

- **Flexibilidad de cosecha**
Puede programarse para heno o forraje conservado cuando la madurez y el secado son adecuados.
- **Forraje conservado**
Ofrece una opción para ensilaje cuando se manejan correctamente humedad, picado y etapa de cosecha.
- **Resiliencia a periodos secos**
Una vez establecido, puede mantener función útil en periodos secos según la profundidad del suelo y las condiciones locales.
- **Ajuste al sistema**
Use el perfil, la información vigente del lote y la orientación agronómica local para ubicar este producto en el sistema correcto.

RESUMEN DEL PRODUCTO

TIPO DE CULTIVO

Gramínea · Perenne

ESTACIÓN / CLIMA

Estación cálida

FUNCIONES PRINCIPALES

Cut-and-carry · Heno · Ensilaje

APTITUD GENERAL DEL SUELO

Confirmar localmente

pH DEL SUELO

4.5–8.0

Establezca bien. Maneje el ciclo completo

ESTABLECIMIENTO

- 01 Elija la ventana**
Ajuste la siembra a la estación del producto, el riesgo de heladas y la perspectiva de humedad del lote.
- 02 Analice y prepare**
Use un análisis de suelo vigente, controle la vegetación competidora y prepare la zona para lograr buen contacto.
- 03 Calibre el lote**
Confirme el lote de semilla, germinación, tratamiento y si la dosis se expresa como semilla a granel o semilla pura viable.
- 04 Establezca con cuidado**
Siga la referencia técnica para colocación y método, y verifique temprano emergencia y uniformidad.
- 05 Proteja el establecimiento**
Retrase tránsito, pastoreo o cosecha hasta que raíces y puntos de crecimiento permitan recuperación.

REFERENCIA TÉCNICA

pH del suelo
4.5–8.0

Dosis de siembra
8–10 kg/ha

Primer corte
90–150 días

Intervalo de corte
45–55 días

Materia seca
35–40 t/ha/año

Proteína cruda
Hasta 17%

MANEJO

- 01 Defina el objetivo**
Maneje el cultivo para su función principal: cobertura, recuperación del suelo, forraje, grano, tubérculos o una combinación planificada.
- 02 Observe la etapa**
Use la etapa del cultivo y la condición del lote, no solo el calendario, para decidir pastoreo, cosecha o terminación.
- 03 Mantenga la función**
Monitoree humedad, fertilidad, malezas, plagas y densidad; ajuste antes de perder productividad.
- 04 Planifique lo siguiente**
Coordine residuo, rebrote o terminación con las necesidades y la ventana de la siguiente actividad.
- 05 Verifique localmente**
Adapte el programa al clima, suelo, regulación, categoría animal y etiqueta del producto en su mercado.

Digestibilidad
Hasta 70%

Altura
120–150 cm

Tolerancia a anegamiento
Baja

Hábito de crecimiento
Perenne erecta

Altitud
0–1,400 m

Altura de corte
Conflicto entre fuentes — aprobar localmente

NOTA IMPORTANTE DE MANEJO

Los valores de referencia no son garantías de desempeño. Confirme el lote, la etiqueta, la recomendación agronómica local y cualquier restricción de uso animal antes de sembrar o alimentar. Confirme la altura de corte y el residual oficiales para el mercado de destino.

Base técnica: Tropical Seeds — Grasses Fichas Técnicas; Grupo Papalotla — current Cobra product page

NOTA DE CAMPO

Las dosis y el desempeño varían según ambiente, lote y manejo. Escanee para consultar el perfil vigente y los recursos de apoyo.

MÁS INFORMACIÓN



EVIDENCIA DE CAMPO ESPECÍFICA DEL SITIO

Cobra frente al sorgo forrajero DKS74

La Esperanza · Chiapas, Mexico

2014-2015 · 270 días · 9 cortes

Comparación suministrada por Papalotla entre Cobra y sorgo forrajero DKS74 durante nueve cortes. El resultado es específico del sitio y manejo.

RENDIMIENTO DE MS

9,845 lb/ac

Sorgo 8.329

PROTEÍNA CRUDA

14%

Sorgo 8%

DIGESTIBILIDAD

69%

Sorgo 60%

NDT

60%

Sorgo 55%

REGISTRO DE CORTES

9 cuts / 270 days

Observación del ensayo

QUÉ MUESTRA EL RESULTADO SUMINISTRADO

- Cobra produjo cerca de 18% más materia seca y presentó mayor proteína cruda, digestibilidad y NDT que el sorgo comparador.
- La página del ensayo identifica BR02/1794; el perfil actual indica BR02/1752. Confirmar el código antes de usarlo en una especificación formal.

INTERPRETAR CON CONTEXTO

Resultado observado en campo, no una garantía de desempeño. Confirmar identidad del producto, forma actual de semilla y recomendación agronómica local.

IMÁGENES DE CAMPO SUMINISTRADAS

Registro visual de la evaluación

Imágenes extraídas del dossier de resultados técnicos de Papalotla y conservadas junto con la evidencia del producto nombrado.



Cosecha de corte y acarreo en el ensayo suministrado de México