

Lablab

Lablab purpureus

LEGUMINOSA · ANUAL / PERENNE DÉBIL · ESTACIÓN CÁLIDA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Leguminosa vigorosa de estación cálida para forraje, cobertura, abono verde y sistemas de vida silvestre, con buena adaptación al calor y a periodos de sequía una vez establecida.

POR QUÉ CONSIDERAR ESTE PRODUCTO

- Forraje manejado**
 Puede apoyar objetivos forrajeros al coordinar etapa de cosecha, categoría animal y orientación local.
- Nitrógeno biológico**
 Como leguminosa, puede apoyar la fijación biológica de nitrógeno con rizobios compatibles y buen establecimiento.
- Resiliencia a periodos secos**
 Una vez establecido, puede mantener función útil en periodos secos según la profundidad del suelo y las condiciones locales.
- Aptitud como abono verde**
 Se integra en rotaciones planificadas que devuelven biomasa y nutrientes al suelo antes del cultivo siguiente.

RESUMEN DEL PRODUCTO

TIPO DE CULTIVO

Leguminosa · Anual / perenne débil

ESTACIÓN / CLIMA

Estación cálida

FUNCIONES PRINCIPALES

Forraje · Nitrogen · Sequía

APTITUD GENERAL DEL SUELO

Confirmar localmente

pH DEL SUELO

5.0–7.5

Establezca bien. Maneje el ciclo completo

ESTABLECIMIENTO

- 01 Elija la ventana**
Ajuste la siembra a la estación del producto, el riesgo de heladas y la perspectiva de humedad del lote.
- 02 Analice y prepare**
Use un análisis de suelo vigente, controle la vegetación competidora y prepare la zona para lograr buen contacto.
- 03 Calibre el lote**
Confirme el lote de semilla, germinación, tratamiento y si la dosis se expresa como semilla a granel o semilla pura viable.
- 04 Establezca con cuidado**
Siga la referencia técnica para colocación y método, y verifique temprano emergencia y uniformidad.
- 05 Favorezca la nodulación**
Use el inoculante compatible cuando corresponda y protéjalo del calor, secado y tratamientos incompatibles.

REFERENCIA TÉCNICA

pH del suelo
5.0–7.5

Profundidad de siembra
2.5–4 cm in a prepared seedbed

Biomasa forrajera
1.4–2.5 t DM/ac

Tolerancia a sequía
Alta una vez establecida

Tolerancia a anegamiento
Baja; requiere drenaje

Inoculación
Rizobios apropiados para lablab o del grupo caupí

MANEJO

- 01 Defina el objetivo**
Maneje el cultivo para su función principal: cobertura, recuperación del suelo, forraje, grano, tubérculos o una combinación planificada.
- 02 Observe la etapa**
Use la etapa del cultivo y la condición del lote, no solo el calendario, para decidir pastoreo, cosecha o terminación.
- 03 Mantenga la función**
Monitoree humedad, fertilidad, malezas, plagas y densidad; ajuste antes de perder productividad.
- 04 Planifique lo siguiente**
Coordine residuo, rebrote o terminación con las necesidades y la ventana de la siguiente actividad.
- 05 Verifique localmente**
Adapte el programa al clima, suelo, regulación, categoría animal y etiqueta del producto en su mercado.

Usos principales
Forraje, heno, ensilaje, cobertura y abono verde

Proteína cruda foliar
21–38%

Dosis en monocultivo
12–20 kg/ha

Dosis en mezcla con gramíneas
5–8 kg/ha

Temperatura ideal
18–30°C

Hábito de crecimiento
Herbácea trepadora anual o perenne débil

NOTA IMPORTANTE DE MANEJO

Los valores de referencia no son garantías de desempeño. Confirme el lote, la etiqueta, la recomendación agronómica local y cualquier restricción de uso animal antes de sembrar o alimentar.

Base técnica: Tropical Forages — Lablab purpureus profile; USDA-NRCS — Lablab (Lablab purpureus) Plant Guide; Texas A&M AgriLife — Rio Verde Lablab recommendations and utilization

NOTA DE CAMPO

Las dosis y el desempeño varían según ambiente, lote y manejo. Escanee para consultar el perfil vigente y los recursos de apoyo.

MÁS INFORMACIÓN

