

Mulato II

Brachiaria hybrid CIAT 36087

GRAMÍNEA · PERENNE · ESTACIÓN CÁLIDA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Híbrido perenne de Brachiaria para pasturas tropicales, con buena calidad forrajera, tolerancia a sequía y flexibilidad para pastoreo o heno.

POR QUÉ CONSIDERAR ESTE PRODUCTO

- **Desempeño en pastura**
Apoya sistemas productivos cuando entrada, residual, descanso y fertilidad se manejan como un solo programa.
- **Resiliencia a periodos secos**
Una vez establecido, puede mantener función útil en periodos secos según la profundidad del suelo y las condiciones locales.
- **Forraje manejado**
Puede apoyar objetivos forrajeros al coordinar etapa de cosecha, categoría animal y orientación local.
- **Flexibilidad de cosecha**
Puede programarse para heno o forraje conservado cuando la madurez y el secado son adecuados.

RESUMEN DEL PRODUCTO

TIPO DE CULTIVO

Gramínea · Perenne

ESTACIÓN / CLIMA

Estación cálida

FUNCIONES PRINCIPALES

Pastura · Sequía · Forraje

APTITUD GENERAL DEL SUELO

Confirmar localmente

pH DEL SUELO

4.5–8.0

Establezca bien. Maneje el ciclo completo

ESTABLECIMIENTO

01

Elija la ventana

Ajuste la siembra a la estación del producto, el riesgo de heladas y la perspectiva de humedad del lote.

02

Analice y prepare

Use un análisis de suelo vigente, controle la vegetación competidora y prepare la zona para lograr buen contacto.

03

Calibre el lote

Confirme el lote de semilla, germinación, tratamiento y si la dosis se expresa como semilla a granel o semilla pura viable.

04

Establezca con cuidado

Siga la referencia técnica para colocación y método, y verifique temprano emergencia y uniformidad.

05

Proteja el establecimiento

Retrase tránsito, pastoreo o cosecha hasta que raíces y puntos de crecimiento permitan recuperación.

MANEJO

01

Defina el objetivo

Maneje el cultivo para su función principal: cobertura, recuperación del suelo, forraje, grano, tubérculos o una combinación planificada.

02

Observe la etapa

Use la etapa del cultivo y la condición del lote, no solo el calendario, para decidir pastoreo, cosecha o terminación.

03

Mantenga la función

Monitoree humedad, fertilidad, malezas, plagas y densidad; ajuste antes de perder productividad.

04

Planifique lo siguiente

Coordine residuo, rebrote o terminación con las necesidades y la ventana de la siguiente actividad.

05

Verifique localmente

Adapte el programa al clima, suelo, regulación, categoría animal y etiqueta del producto en su mercado.

REFERENCIA TÉCNICA

pH del suelo

4.5–8.0

Dosis de siembra

8–10 kg/ha

Primer pastoreo

90–110 días

Materia seca

25–30 t/ha/año

Proteína cruda

Hasta 18%

Digestibilidad

Hasta 65%

Altura

100–150 cm

Residual

15–20 cm

Tolerancia a anegamiento

Baja

Período de descanso

25–35 días

Hábito de crecimiento

Perenne semidecumbente

Altitud

0–1,400 m

NOTA IMPORTANTE DE MANEJO

Los valores de referencia no son garantías de desempeño. Confirme el lote, la etiqueta, la recomendación agronómica local y cualquier restricción de uso animal antes de sembrar o alimentar.

Base técnica: Tropical Seeds — Grasses Fichas Técnicas; Grupo Papalotla — current Mulato II product page

NOTA DE CAMPO

Las dosis y el desempeño varían según ambiente, lote y manejo. Escanee para consultar el perfil vigente y los recursos de apoyo.

MÁS INFORMACIÓN

