



Ruziziensis

Urochloa ruziziensis

GRAMÍNEA · PERENNE / MANEJADA COMO COBERTURA ANUAL · ESTACIÓN CÁLIDA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Gramínea tropical de raíces vigorosas que puede manejarse como cultivo de cobertura anual o pastura, especialmente útil en rotaciones temporales y mezclas con crotalaria.

POR QUÉ CONSIDERAR ESTE PRODUCTO

- **Función del sistema radical**
El desarrollo de raíces favorece agregación, infiltración y actividad biológica del suelo.
- **Desempeño en pastura**
Apoya sistemas productivos cuando entrada, residual, descanso y fertilidad se manejan como un solo programa.
- **Herramienta de rotación dirigida**
Puede apoyar programas contra nematodos después de confirmar la especie objetivo y la respuesta local.
- **Cobertura viva**
Puede proteger el piso de frutales cuando se manejan competencia, corte y humedad.

RESUMEN DEL PRODUCTO

TIPO DE CULTIVO

Gramínea · Perenne / manejada como cobertura anual

ESTACIÓN / CLIMA

Estación cálida

FUNCIONES PRINCIPALES

Cultivo de cobertura · Raíces · Pastura

APTITUD GENERAL DEL SUELO

Confirmar localmente

pH DEL SUELO

5.0–7.0 · referencia de la especie

Establezca bien. Maneje el ciclo completo

ESTABLECIMIENTO

- 01 Elija la ventana**
Ajuste la siembra a la estación del producto, el riesgo de heladas y la perspectiva de humedad del lote.
- 02 Analice y prepare**
Use un análisis de suelo vigente, controle la vegetación competidora y prepare la zona para lograr buen contacto.
- 03 Calibre el lote**
Confirme el lote de semilla, germinación, tratamiento y si la dosis se expresa como semilla a granel o semilla pura viable.
- 04 Establezca con cuidado**
Siga la referencia técnica para colocación y método, y verifique temprano emergencia y uniformidad.
- 05 Proteja el establecimiento**
Retrase tránsito, pastoreo o cosecha hasta que raíces y puntos de crecimiento permitan recuperación.

REFERENCIA TÉCNICA

pH del suelo
5.0–7.0 · referencia de la especie

Dosis de cobertura
8–10 kg/ha

Dosis para pastura
8–10 kg/ha

Profundidad de siembra
2–4 cm

Materia seca
12–20 t/ha/año

Proteína cruda
10–14%

MANEJO

- 01 Defina el objetivo**
Maneje el cultivo para su función principal: cobertura, recuperación del suelo, forraje, grano, tubérculos o una combinación planificada.
- 02 Observe la etapa**
Use la etapa del cultivo y la condición del lote, no solo el calendario, para decidir pastoreo, cosecha o terminación.
- 03 Mantenga la función**
Monitoree humedad, fertilidad, malezas, plagas y densidad; ajuste antes de perder productividad.
- 04 Planifique lo siguiente**
Coordine residuo, rebrote o terminación con las necesidades y la ventana de la siguiente actividad.
- 05 Verifique localmente**
Adapte el programa al clima, suelo, regulación, categoría animal y etiqueta del producto en su mercado.

Digestibilidad
55–60%

Profundidad de raíces
Hasta 3 m

Dosis en mezcla ICL
4–6 kg/ha

Hábito de crecimiento
Gramínea tropical decumbente

Dosis en frutales
10 kg/ha

Palatabilidad
Muy alta

NOTA IMPORTANTE DE MANEJO

Los valores de referencia no son garantías de desempeño. Confirme el lote, la etiqueta, la recomendación agronómica local y cualquier restricción de uso animal antes de sembrar o alimentar.

Base técnica: Tropical Seeds — Brachiaria Ruziziensis English technical brochure

NOTA DE CAMPO

Las dosis y el desempeño varían según ambiente, lote y manejo. Escanee para consultar el perfil vigente y los recursos de apoyo.

MÁS INFORMACIÓN

